



3. Sausra augalų vegetacijos laikotarpiu balandžio 24–gegužės 13 d.

Balandis Lietuvoje buvo vėsus ($1,3^{\circ}$ vėsesnis nei norma) ir sausas (kritulių vos 38 % nei įprastai). Antrojo dešimtadienio pradžioje kai kuriuose šalies rajonuose pradėtas fiksuoti pavojingas meteorologinis reiškinys (PMR) – *sausringas laikotarpis augalų vegetacijos laikotarpiu*. Pirmiausia jis fiksuotas keliose Vilkaviškio r. seniūnijose, vėliau išplito į greta esančias Marijampolės ir Kalvarijos apylinkes bei į kai kuriuos šiaurinius ir rytinius bei pavienius pietvakarinius rajonus. Nepaisant fakto, kad dėl pasirodžiusių kritulių PMR daug kur baigėsi, visgi trečiojo mėnesio dešimtadienio viduryje vietomis sausringas laikotarpis sustiprėjo iki stichinio meteorologinio reiškinio (SMR) – *sausros augalų vegetacijos laikotarpiu* (**1 pav.**).



1 pav. PMR ir SMR paplitimas balandžio 27 d.

Šis SMR balandžio 24–26 d. registruotas Vilkaviškio rajone (trukmė 3 dienos), balandžio 25–28 d. – vietomis Kalvarijos savivaldybėje (trukmė 2–4 dienos), nuo balandžio 29 d. SMR pradėtas fiksuoti kai kur Pasvalio ir Panevėžio rajone. Sausros apimama teritorija gegužės pirmąjį dešimtadienį plėtėsi į Akmenės, Mažeikių, Panevėžio, Radviliškio, Pasvalio ir Kėdainių r. sav. (**2 pav.**). Tuo metu PMR paskutinę minėto dešimtadienio dieną fiksuotas pavienėse Skuodo, Akmenės, Mažeikių, Joniškio, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Plungės ir Jurbarko r. sav. seniūnijose.



2 pav. PMR ir SMR paplitimas gegužės 10 d.